

Μάθημα 13°

Άσκηση 6.4.2 $X \neq \emptyset$ (1)

~~Αν~~ Αν \mathcal{F} οικογένεια αλγεβρών υποσυνόλων του X τότε (2)

$\cap_{A \in \mathcal{F}} A$ είναι αλγεβρα. Ομοίως για σ -αλγεβρες (3)

Λύση Λύνουμε την άσκηση για σ -αλγεβρες: Έσω ότι (4)

\mathcal{F} οικογένεια σ -αλγεβρων υποσυνόλων του X και ~~και~~ (5)

$$B = \cap_{A \in \mathcal{F}} A \quad \text{Αν } B \in \mathcal{B} \Rightarrow B \in \mathcal{A} \quad \forall A \in \mathcal{F} \quad \} \Rightarrow B^c \quad \forall \quad (6)$$

$$\text{Αλλά } \mathcal{A} \dots \dots \dots \quad \} \Rightarrow B^c \quad \forall \quad (7)$$

$$\text{αφ'ότι } B^c \in \mathcal{A} \quad (8)$$

$$\text{Αν } B_n \in \mathcal{B} \text{ για } n=1,2,\dots \Rightarrow B_n \in \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{F} \quad \} \Rightarrow \quad (9)$$

$$\Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A} \quad \forall \quad \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{B} \quad (10)$$

Άρα \mathcal{B} σ -αλγεβρα. (12)

Ορισμός Αν S οικογένεια υποσυνόλων του X . (13)

$$\text{Η } \sigma(S) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ } \sigma\text{-αλγεβρα } \supseteq S \} \text{ είναι} \quad (14)$$

μία σ -αλγεβρα που περιέχει την οικογένεια S και (15)

μάλιστα είναι η ελάχιστη με αυτή την ιδιότητα (16)

Η $\sigma(S)$ λέγεται η σφιχτή (17)

Αν (X,d) μετρικός χώρος και \emptyset το σύνολο όλων των ανοικτών (18)

υποσυνόλων του X η $\sigma(\emptyset)$, δηλαδή η ελάχιστη σ -αλγεβρα (19)

που περιέχει τα ανοικτά σύνολα ονομάζεται Borel σ-άλγεβρα (1)
και συμβολίζεται με $\mathcal{B}(X)$. (2)

Άσκηση 6.4.13 (Λήμμα Borel-Cantelli) (3)

Αν $E_n \in \mathcal{M}$ με $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty \Rightarrow \mu(\limsup E_n) = 0$ (4)

όπου $\limsup E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m \right)$ (5)

Λύση Αν θεωρήσουμε $A_n = \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m$ τότε $A_n \downarrow$ και (6)

$\mu(A_1) = \mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E_m) < \infty$ (7)

Άρα $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \stackrel{\text{υποσφ.}}{\leq} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} \mu(E_m)$ (8)

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \mu(E_m) - \sum_{m=1}^{n-1} \mu(E_m) \right) = 0$ ▣ (9)

Άσκηση 6.1.5 Δίνονται ανοικτά διαστήματα I_1, \dots, I_n . (10)

Δείξτε ότι αν το $\bigcup_{i=1}^n I_i$ περιέχει το $[0, 1]$ τότε (11)

$\sum_{i=1}^n \ell(I_i) \geq 1$ (12)

Λύση Αν $\sum_{i=1}^n \ell(I_i) < 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \ell(\bar{I}_i) \Rightarrow$ (13)

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \mu(\bar{I}_i) \stackrel{\text{υποσφ.}}{\implies} \mu\left(\bigcup_{i=1}^n \bar{I}_i\right) < 1$ (14)

$\Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^n (\bar{I}_i \cap [0, 1])\right) \leq \mu\left(\bigcup_{i=1}^n \bar{I}_i\right) < 1$. Άρα (15)

$\mu\left([0, 1] \setminus \bigcup_{i=1}^n (\bar{I}_i \cap [0, 1])\right) > 0$. Συνεπώς το (16)

$[0, 1] \setminus \bigcup_{i=1}^n (\bar{I}_i \cap [0, 1])$ είναι μη κενό και ανοικτό υποσύνολο $[0, 1]$. Άρα περιέχει ρητό, άρα ▣ (18)

Άσκηση (α) Το εξωτερικό μέτρο μ^* είναι αναλλοίωτο (1)

ως μετατόμιση. Δηλαδή $\forall E \subseteq \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (2)

$$\text{αν } E+x = \{y+x : y \in E\} \text{ τότε } \mu^*(E+x) = \mu^*(E) \quad (3)$$

(β) $\forall A \in \mathcal{M} \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow A+x \in \mathcal{M} \quad \mu(A+x) = \mu(A)$ (4)

Λύση (α) $\mu^*(E+x) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^n l(I_j) : I_j = [a_j, b_j) \text{ \& } E+x \subseteq \bigcup_{j=1}^n I_j \right\}$ (5)

$$= \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} l(I_j) : I_j = [a_j, b_j) \text{ \& } E \subseteq \dots \right\} \quad (6)$$

$$= \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} l(I_j - x) : I_j - x = [a_j - x, b_j - x) \text{ \& } E \subseteq \dots \right\} \quad (7)$$

$$= \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} l(I'_j) : I'_j = [a'_j, b'_j) \text{ \& } E \subseteq \dots \right\} \quad (8)$$

$$= \dots \quad (9)$$

(β) $\mu^*(E \cap (A+x)) + \mu^*(E \cap ((E-x) \cap A) + x) = \mu^*((E-x) \cap A) + \mu^*((E-x) \cap A) + x$ (10)

(α) $\mu^*(\dots) = \dots$ (11)

$$\Rightarrow A+x \in \mathcal{M} \quad (12)$$

Πρόταση Για κάθε $A \subseteq \mathbb{R}$ τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα (13)

(i) A μετρήσιμο (ii) $\forall \varepsilon > 0 \exists$ θανοικό G με $\mu^*(G \setminus A) < \varepsilon$ (14)

(iii) \exists G σύνολο $G \supseteq A$ ώστε $\mu^*(G \setminus A) = 0$ (15)

Απόδειξη (i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i) (16)

Αρα $\forall \varepsilon > 0 \exists$ U ανοικό \supseteq A ώστε $\mu(U \setminus A) < \varepsilon$ (17)

$$\text{Αν } \mu(A) < \infty \text{ τότε } \Rightarrow \mu(U \setminus A) < \varepsilon \quad (18)$$

Αν $\mu(A) = \infty$ θεωρ $A_n = A \cap [-n, n]$ και βρισκω οπωρην (19)

ανοικό U_n ώστε $U_n \supseteq A_n$ (20)

Θετούμε $V = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \supseteq A$, U ανοικτός και $\mu(U \setminus A) =$ (1)

$= \mu(\dots) \leq \mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} (U_n \setminus A_n)) \leq$ (2)

\uparrow
 $\leq \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon/2^n$ (3)

$\leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^n} = \epsilon$ (4)

(ii) \Rightarrow (iii) Έστω G_n ανοικτός $\supseteq A$ $\hookrightarrow \mu(G_n \setminus A) < \frac{1}{n}$ (5)

Θέσω $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ -σύνολο $\supseteq A$ \hookrightarrow (6)

$\mu(G \setminus A) \leq \dots \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \mu(G \setminus A) = 0$ (7)

(iii) \Rightarrow (i) Το $G \setminus A$ είναι μετρήσιμο ως σύνολο (8)

η το G είναι μετρήσιμο ως (9)

Άρα $A \in \mathcal{M}$ γιατί $A = G \setminus (G \setminus A)$ διότι $G \supseteq A$ \square 10