

Μάθημα 16

Θεώρημα Η f είναι μετρήσιμη αν $-v$ μια από τις ακόλουθες (1)

(i) $\forall a \in \mathbb{R} \quad \{x : f(x) \geq a\} \in \mathcal{M}$ (2)

(ii) $\forall a \in \mathbb{R} \quad \{x : f(x) < a\} \in \mathcal{M}$ (3)

(iii) $\forall a \in \mathbb{R} \quad \{x : f(x) \leq a\} \in \mathcal{M}$ (4)

Απόδειξη Παρατηρούμε πρώτα ότι $\bigcup_{n=1}^{\infty} [a + \frac{1}{n}, +\infty) = \dots$ (5)

και $\bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, +\infty) = \dots$. Οπότε (6)

$$\{x : f(x) \geq a\} = f^{-1}(\dots) = f^{-1}(\dots) \quad (7)$$

$$= \bigcap f^{-1}(\dots) = \bigcap \{x : f(x) > a - \frac{1}{n}\} \in \mathcal{M} \quad (8)$$

Αυτός αποδεικνύει το «μετρήσιμη \Rightarrow (i)» (9)

$$(i) \Rightarrow (ii) \quad \{x : f(x) < a\} = \{x : f(x) \geq a\}^c \in \mathcal{M} \quad (10)$$

$$(ii) \Rightarrow (iii) \quad \{x : f(x) \leq a\} = f^{-1}(\dots) = \dots \quad (11)$$

$$= f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [-\infty, a + \frac{1}{n})\right) = \dots \quad \text{(αόρατα όρια (12) ή το προηγούμενο)}$$

$$(iii) \Rightarrow f \text{ μετρήσιμη} : \quad \{x : f(x) > a\} = \{x : f(x) \leq a\}^c \in \mathcal{M} \quad (13)$$



Ορισμός Στο $\tilde{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ κάνουμε τη σύμβαση (14)

$$0 \cdot (+\infty) = 0 \cdot (-\infty) = (+\infty) \cdot 0 = (-\infty) \cdot 0 = 0 \quad (15)$$

Οι πράξεις $(+\infty) - (+\infty)$, $(-\infty) - (-\infty)$, $(+\infty) + (-\infty)$, $(-\infty) + (+\infty)$ (16)

παράγουν απροσδιόριστο, καθώς και η διαίρεση με το μηδέν (17)

Έτσι οι $f+g$, $f-g$, f/g δεν ορίζονται πάντα (18)

$o.c \quad f \cdot g, \max\{f, g\}, \min\{f, g\} \quad f_+ = \max\{f, 0\} \quad f_- = \min\{f, 0\} \quad (1)$

$|f|$ ορίζεται πάντα.

Λήμμα
Av $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μετρήσιμη τότε $\forall a \in \mathbb{R}$ το $f^{-1}(\{a\}) =$ (2)

$= \{x : f(x) = a\}$ είναι μετρήσιμο (3)

Απόδειξη Av $a \in \mathbb{R}$, τα $\{x : f(x) \geq a\}$ \cup $\{x : f(x) \leq a\}$ (4)

είναι μετρήσιμα άρα $\{x : f(x) = a\} = \cap \in \mathcal{M}$ (5)

Av $a = +\infty$ τότε $\{x : f(x) = a\} = \{x : f(x) = +\infty\}$ (6)




$= \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \geq n\} \in \mathcal{M}$ (7)

Av $a = -\infty$ τότε $\{x : f(x) = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq -n\} \in \mathcal{M}$ (8)

Ορισμός $\forall f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ορίζουμε τις $f^+, f^- : A \rightarrow [0, \infty)$ (9)

$f^+(x) = \max\{f(x), 0\} = \begin{cases} f(x) & \text{av } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{av } f(x) < 0 \end{cases}$ (10)

$f^-(x) = \max\{-f(x), 0\} = \begin{cases} -f(x) & \text{av } f(x) \leq 0 \\ 0 & \text{av } f(x) > 0 \end{cases}$ (11)



Φανερά $f = f^+ - f^-$ \cup $|f| = f^+ + f^-$ (12)

f^+ «δεξιά μέρος» της f \cup f^- «αριστερά μέρος» της f (13)

Επιπλέον $\frac{f+|f|}{2} = f^+$ \hookrightarrow $\frac{|f|-f}{2} = f^-$ (1)

Θεώρημα Αν f, g μετρήσιμες $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ τότε οι συναρτήσεις (2)

(i) $f+g$ (ii) λf (iii) $f^2, |f|$ (iv) $f \cdot g$ (v) $\max\{f, g\}$ (3)

(vi) $\min\{f, g\}$ (vii) f^+, f^- (4)

είναι όλες μετρήσιμες (5)

Απόδειξη (i) Ισχυρισμός $f(x)+g(x) > a \iff \exists r \in \mathbb{Q}$ ώστε (6)

$f(x) > r, g(x) > a-r$ (7)

[\Leftarrow] προφανώς από $f(x)+g(x) > r+(a-r) = a$ (8)

[\Rightarrow] Αφού $f(x)+g(x) > a \implies \begin{cases} f(x) \neq -\infty \\ g(x) \neq -\infty \end{cases}$ (9)

Αρα $f(x) > a - g(x) \implies \exists$ πρώτος r ανάμεσα: (11)

$f(x) > r > a - g(x) \implies \begin{cases} f(x) > r \\ g(x) > a-r \end{cases}$ (12) (13)

Συνεπώς $\{x: (f+g)(x) > a\} = \left(\{x: f(x) > r\} \cap \{x: g(x) > a-r\} \right) \in \mathcal{M}$ (14) (15)

(ii) Αν $\lambda = 0 \implies \lambda f = 0$ μετρήσιμη (16)

Αν $\lambda > 0 \implies \{x: (\lambda f)(x) > a\} = \dots \in \mathcal{M}$ (17)

Αν $\lambda < 0 \implies \{x: (\lambda f)(x) > a\} \dots \in \mathcal{M}$ (18)

(iii) $\{x: (f(x))^2 > a\} = \begin{cases} \text{αν } a < 0 \\ \text{αν } a = 0 \end{cases} \dots \in \mathcal{M}$ (19) (20) (21)

οποίως για την $|f|$ αν $a > 0$ (22) (23)

(iv) Θεω $B_1 = \{x : f(x) = +\infty\} \cap \{x : g(x) = -\infty\}$ (1)

$B_2 = \{x : f(x) = -\infty\} \cap \{x : g(x) = +\infty\}$ (2)

$B_3 = \{x : f(x) = +\infty\} \cap \{x : g(x) = +\infty\}$ (3)

$B_4 = \{x : f(x) = -\infty\} \cap \{x : g(x) = -\infty\}$ (4)

$B_1, B_2, B_3, B_4 \in \mathcal{M} \implies B := B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4 \in \mathcal{M} \implies A \setminus B \in \mathcal{M}$ (5)

Θεω $f_1 = f|_{A \setminus B}$ $g_1 = g|_{A \setminus B}$ τότε f_1, g_1 μετρήσιμα (6)

$f_1 g_1 = \frac{1}{2} \left((f_1 + g_1)^2 - f_1^2 - g_1^2 \right)$ (7)

[⊕ $\{x \in A \setminus B : f_1(x) > a\} = \{x \in A : f(x) > a\} \setminus B \in \mathcal{M}$] (8)

(9)

Αρα f_1, g_1 μετρήσιμα

Τέλος $\{x \in A : (fg)(x) > a\} = \{x \in A \setminus B : (f_1 g_1)(x) > a\} \cup B_3 \cup B_4 \in \mathcal{M}$ (10)

(11)

Αρα fg μετρήσιμα

(v) $\{x : \max\{f, g\}(x) > a\} = \{ \} \cup \{ \}$ (12)

$\in \mathcal{M}$ (13)

$\{x : \min\{f, g\}(x) > a\} = \{ \} \cap \{ \}$ (14)

$\in \mathcal{M}$ (15)

(vi) ομοίως με το (v).

(16)